



Medikamenteneinnahme nach der Adipositas Operation

Eine bestimmte Gruppe an Schmerzmittel, den so genannten NSARs (nicht steroidale Antirheumatika) sollten Sie nach der Adipositas-Operation nach Möglichkeit nicht mehr einnehmen.

Die NSAR Medikamente wirken sehr aggressiv auf die Magenschleimhaut und können Magenschleimhautentzündungen hervorrufen und bis hin zu Magengeschwüren führen.

Durch die Gewichtsreduktion und den dadurch positiven Einfluss auf Begleiterkrankungen ändert sich oft der Bedarf an Medikamenten.

Wichtig ist hierbei, die Medikamenteneinnahme immer mit dem behandelnden Hausarzt besprechen.

Hier sind ein paar Präparate aufgelistet, die zu den NSARs gehören und Alternativen darstellen:

NSAR

- Aspirin
- Ibuprofen
- Naproxen
- Sugam
- Dobendan
- Dayrun
- Deltaran
- Ketoprofen
- Dismeno
- Aktren
- Diclofenac
- Celebrex
- Arcoxia
- Dexketoprofen

Alternativen

- Ortoton
- Mydocalm
- Buscopan
- Paracetamol
- Novalgin
- Tramal
- Valoron